

## 登園の目安

	登園を控えるのが望ましい場合	登園が可能な場合
発熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>●活気、機嫌が悪く、食欲がない</li> <li>●24時間以内に37.5℃以上の熱が出ていた</li> <li>●24時間以内に解熱剤を使った</li> </ul> 1歳以下の場合： <ul style="list-style-type: none"> <li>●平熱より1℃以上高い(37.5℃以上ある)</li> </ul> 熱性けいれんの既往がある場合、園にご相談下さい。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●発熱後24時間</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○前日に37.5℃以上の熱が出ていない</li> <li>○朝は37.5℃以下で活気があり機嫌もよい</li> <li>○咳や鼻水の症状が悪化していない</li> <li>○発熱に伴う発疹は出ていない</li> <li>○食事や水分がとれている</li> <li>○排尿回数が減っていない</li> </ul>
咳	<ul style="list-style-type: none"> <li>●咳のため夜間起きる</li> <li>●連続して咳き込む</li> <li>●呼吸をする時ゼイゼイという音を発する</li> <li>●呼吸がつからそう</li> <li>●少し動いただけで咳がでる</li> <li>●機嫌が悪く、食欲がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○前日に37.5℃以上の熱が出ていない</li> <li>○連続した咳をしない</li> <li>○機嫌がよく、食事もとれている</li> </ul>
下痢	<ul style="list-style-type: none"> <li>●24時間以内に2回以上水様便あり</li> <li>●食事や水分摂取毎に下痢になる</li> <li>●朝に排尿がない</li> <li>●体温がいつもより高い</li> <li>●機嫌が悪く、元気がない</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○24時間以内に2回以上水様便なし</li> <li>○食事や水分摂取をしても下痢にならない</li> <li>○排尿回数がいつも通り</li> <li>○発熱を伴わない</li> </ul>
嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> <li>●24時間以内に2回以上の嘔吐あり</li> <li>●食欲や活気がない</li> <li>●水分がとれない</li> <li>●嘔気があり、いつもより体温が高い</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○24時間以内に2回以上の嘔吐がない</li> <li>○食事や水分摂取をしても吐かない</li> <li>○機嫌がよく、顔色も良い</li> </ul>
発疹	<ul style="list-style-type: none"> <li>●発熱に伴って発疹がみられる</li> <li>●口内炎で食事がとれない</li> <li>●とびひ：顔などで患部を覆えない、患部を搔いてしまう、じくじくして他児に感染の恐れがある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○医療機関を受診の結果、感染の恐れがなく、全身状態が良いと診断された</li> </ul>

※登園の目安としていただき、迷われたときはお電話ください。

※病後児保育をご希望の方は看護師へご相談ください。

## 保護者連絡、受診の目安

	お迎えを要請する場合	至急受診が必要な場合
発熱	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2回以上測定して<b>37.5℃以上</b>の発熱がある (2回目の測定は衣服を調整、飲水摂取、排尿介助を行い30分以上経過してから測定)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 顔色が悪く、苦しそうなとき</li> <li>● 小鼻がピクピクして呼吸が速いとき</li> <li>● 意識がはっきりせず、ぐったりしているとき</li> <li>● 頻繁な下痢や嘔吐があるとき</li> <li>● けいれんが起きたとき</li> </ul> <p>(2回目以降はあらかじめ保護者と対応を確認しておき、その通りの対応をする)</p>
咳	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 37.5℃以上の熱がある</li> <li>● 咳があり眠れない</li> <li>● 少し動いただけでも咳がでる</li> <li>● 食事中や食直後以外で胃液様のものを2回以上、咳とともに嘔吐がある</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 呼吸が苦しそうなとき</li> <li>● 顔色が悪く、ぐったりしているとき</li> <li>● 水分摂取ができないとき</li> </ul>
下痢	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食事や水分を摂ると、刺激で下痢をする</li> <li>● 腹痛を伴う下痢がある</li> <li>● 水様便2回以上みられる</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 元気がなく、ぐったりしている</li> <li>● 機嫌が悪く、食欲がない、発熱や嘔吐、腹痛を伴うとき</li> </ul>
嘔吐	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 咳を伴わない嘔吐がある</li> <li>● 元気がなく、機嫌、顔色が悪い</li> <li>● 嘔気が止まらない</li> <li>● お腹を痛がる</li> <li>● 下痢を伴う</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 嘔吐の回数が多く、顔色が悪いとき</li> <li>● 元気がなく、ぐったりしているとき</li> <li>● 血液やコーヒーかすのような物を吐いたとき</li> <li>● 頻回の下痢や血液の混ざった便が出たとき</li> <li>● 脱水症状と思われるとき <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 尿が半日以上出ていない</li> <li>・ 落ちくぼんでみえる目</li> <li>・ 唇や舌が乾いている</li> <li>・ 張りのない皮膚や陰嚢</li> </ul> </li> </ul>
発疹	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食物アレルギーによりアナフィラキシー 食物摂取後に発疹が出現し、その後消化器や呼吸器に症状が出てきた場合は、至急受診が必要。</li> <li>● 発熱して数日後に熱がやや下がるが、24時間以内に再び発熱し、赤い発疹が全身に出てきた。 熱は1週間くらい続く。⇒<u>麻疹</u></li> <li>● 微熱程度の熱が出た後に、手のひら、足の裏、口の中に水疱がでる。 膝やお尻に出ることもある。⇒<u>手足口病</u></li> <li>● 38℃以上の熱が3～4日続き下がった後、全身に赤い発疹が出てきた。⇒<u>突発性発疹</u></li> <li>● 発熱と同時に発疹が出てきた。⇒<u>風疹、溶連菌感染症</u></li> <li>● 微熱と両頬にりんごのような紅斑が出てきた。⇒<u>伝染性紅斑</u></li> <li>● 水疱状の発疹がある。発熱やかゆみは個人差がある。⇒<u>水痘</u></li> </ul>	